JÁRVÁNYVÉDELEM A TELEPEN

Az ileitis megelőzéséért

TUDTA, HOGY AZ ILEITIS MINDEN TELEPEN JELEN VAN?



A *LAWSONIA INTRACELLULÁRIS* KRITIKUS TÉNYEZŐI

MAGAS ARÁNYÚ	AKÁR **14** HÉTEN ÁT	10^4 *L. intracellularis*	>2 HÉTNÉL TÖBB	%
baktérium ürítés a bélsárral	ELHÚZÓDÓ baktérium ürítés	KEVÉS fertőző kórokozó szükséges a befertőződéshez	HOSSZÚ túlélés a környezetben	JELENTŐS visszafertőződési arány

JAVASLATOK

- A tisztítás és a fertőtlenítés maximalizálása
- Mindig legyen rágcsálók elleni hatékony védekezés
- A betegség kitörése után szakítsa meg a fertőzési láncot
- Gondolja meg a vakcinázást (jobb, ha egyedi szinten alkalmazzák)

Ha az alábbi tüneteket tapasztalja, ellenőriztesse állományát állatorvossal

- Hasmenés
- Lemaradás a növekedésben
- A csoportok közötti nagy egyenlőtlenség

Nincs minden telepen egyaránt alkalmazható megoldás.

Az ileitis ellen minden telepen a legjobb védekezési megoldást kell megtalálni.

A VESZTESÉGEK MINIMALIZÁLÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ ELEME A MEGELŐZÉS

Tudjon meg még többet a Lawsonia intracellularisról: www.msd-animal-health.hu/lawsonia/

© 2020 Intervet International B.V. amely az MSD AH néven is ismert.
Minden jog fenntartva! HU-POR-200400005

MSD Animal Health